

定期予防接種の種類と接種方法

予防接種を受ける時期について次の表を参考にしてください

ワクチンの種類		接 種		
		回 数	おすすめする年齢と接種間隔	公費(無料)のできる年齢
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	2回	1回目は生後2か月～生後14週6日まで 27日以上の間隔をあけて2回接種	生後6週～24週まで
	ロタテック (5価)	3回	1回目は生後2か月～生後14週6日まで 27日以上の間隔をあけて3回接種	生後6週～32週まで
B型肝炎		3回	生後2か月～9か月未満 27日以上の間隔をあけて2回接種後、1回目接種から139日 以上あけて3回目接種	1歳未満まで
小児肺炎球菌	初回3回		生後2か月～7か月未満 27日以上の間隔をあけて3回接種(※1)	生後2か月～5歳未満まで
	追加		生後12か月～15か月未満 初回3回目接種終了後、60日以上の間隔をあけて1回接種	
BCG(結核)		1回	生後5か月～8か月未満	1歳未満まで
五種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ・ヒブ)	初回3回		生後2か月～12か月未満 20日以上の間隔をあけて3回接種	生後2か月～7歳6か月未満まで
	追加		初回3回目接種終了後、6か月以上の間隔をあけて1回 接種	
麻しん風しん混合 (MR)	第1期		1歳	生後1歳～2歳未満まで
	第2期		年長児相当年齢(小学校就学前の1年間)	小学校就学前の4月1日～3月31日
水痘 (みずぼうそう)	1回目		生後12か月～15か月未満	生後1歳～3歳未満まで
	2回目		1回目接種終了後、3か月以上の間隔をあけて1回接種	
日本脳炎	第1期 初回 2回		3歳 6日以上の間隔をあけて2回接種	生後6か月～7歳6か月未満まで
	第1期 追加		4歳 初回2回接種終了後、6か月以上の間隔をあけて1回接種	
	第2期		9歳(※2)	9歳～13歳未満まで
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		1回	11歳(※2)	11歳～13歳未満まで
ヒトパピローマウイルス (HPV)感染症		2回 または 3回	中学1年生相当年齢(13歳となる日の属する年度の当日から 年度の末尾までの期間)(※2)	小学6年生(12歳となる日の属する年度の4月 1日)から高校1年生相当(16歳となる日の属 する年度の3月31日)までの女子

(※1)初回接種開始月齢が遅かったり間隔が開きすぎた場合は、接種回数等が異なりますので、医療機関等にお問合せください。

(※2)は接種対象になった際にお知らせします。

「●歳未満」は●歳の誕生日の前日まで接種可能であることを意味します。

「○か月の間隔をあけて」とは、接種日の○か月後の同じ日に接種可能となることを意味します。

主な任意予防接種の種類と接種方法

ワクチンの種類		接 種		
		回 数	対象年齢	接種間隔
おたふくかぜ		2回(※3)	1歳以上	1回目:1歳 2回目:年長児相当年齢(小学校就学前)(※4)
インフルエンザ	2回		生後6か月以上13歳未満	2～4週 (免疫効果を考慮すると4週が望ましい)
	1回		13歳以上	

(※3)日本小児科学会推奨回数

(※4)日本小児科学会推奨間隔

任意予防接種費用の助成については子ども家庭センターへご確認ください。